

ProteinFind[®] Goat Anti-Mouse IgG (H+L), HRP Conjugate

使用前请仔细阅读说明书

目录号: HS201

保存: 2-8℃保存一个月, -20℃保存一年。

产品说明


HRP(辣根过氧化物酶)可催化ECL等化学发光试剂产生化学反应发光, 或催化DAB、TMB等底物显色。HRP标记山羊抗小鼠IgG (H+L)抗体为高纯度的抗小鼠抗体, 可特异识别小鼠IgG重链和轻链, 而对其它种属IgG无明显交叉反应, 具有本底低、灵敏度高等特点, 适用于Western Blot、ELISA等检测。

应用

- Western Blot: 推荐1:1000-10000稀释。
- ELISA: 推荐1:1000-5000稀释。

注意事项

- 建议使用前分装, 避免反复冻融。
- 稀释后的抗体应在12小时内使用, 避免保存稀释后的抗体。
- 叠氮钠是HRP的抑制剂, 避免使用叠氮钠作为抗体稀释时的防腐剂。



EasySee[®] Western Marker上样量 (5 μ l)

本产品仅供研究, 不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

